

CONSIDERACIONES:

- ✓ **Coadministración con otras vacunas:** las vacunas SRP e IPV de campaña pueden ser coadministradas con cualquier vacuna.
- ✓ **Intervalo entre vacunas de virus vivo atenuado:** niñas y niños que recibieron vacunas a virus vivo atenuado (triple viral, varicela o fiebre amarilla) en las últimas 4 semanas, se deberá aplicar la vacuna IPV y citar para la dosis de campaña de triple viral una vez cumplido el intervalo mínimo de 28 días entre vacunas a virus vivo atenuado.
- ✓ **Esquemas atrasados:** niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive que no certifiquen la dosis de triple viral del año o alguna de las 3 dosis de IPV (2, 4 y 6 meses) deberán recibir las vacunas de campaña y se los/las citará para completar las vacunas del calendario.
- ✓ **Contraindicación de vacunación con triple viral:** deben recibir la vacuna IPV correspondiente a la presente campaña.

REGISTRO DE VACUNACIÓN

- ✓ **Registrar en el carnet de vacunación habitual** en el espacio destinado a "otros", dejando constancia de que corresponde a la dosis de campaña, fecha de aplicación, lote y firma.
- ✓ **Registrar diariamente** las dosis aplicadas en el sistema nominal de vacunación electrónico.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

Todo personal de la salud que asista a una persona con sospecha de ESAVI, debe notificarlo en la plataforma SISA a través del siguiente link:

<https://sisa.msal.gov.ar/sisa>

No se requiere ninguna clave de acceso, solo poseer matrícula de medicina, enfermería o farmacia/bioquímica.

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAPERAS Y POLIO 2022



¿PARA QUÉ SE REALIZA?

Para **sostener la eliminación** del sarampión, la rubéola y la poliomielitis en Argentina.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

La población objetivo son **todos los niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive**, nacidos entre 1/11/2017 y 31/08/2021 independientemente de las dosis recibidas previamente.

¿QUÉ VACUNAS SE UTILIZARÁN?

Se aplicarán dos vacunas a todos los niñas y niños: **triple viral (SRP)** y **vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV)**. Ambas dosis son adicionales a las dosis del Calendario Nacional de Vacunación.

¿CUÁNDO SE REALIZA LA CAMPAÑA?

Desde el **1 de octubre al 13 de noviembre de 2022**.

LAS DOSIS DE VACUNAS DE LA CAMPAÑA SON GRATUITAS, OBLIGATORIAS Y NO SE SOLICITARÁ ORDEN MÉDICA.

VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP)

Es una suspensión de cepas de virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y paperas para reconstituir exclusivamente en su diluyente. **Una vez reconstituida, la vacuna debe ser utilizada inmediatamente.**

DOSIS: 0.5ml

CONSERVACIÓN: entre +20°C y +80°C. No congelar. Almacenar protegida de la luz.

PRESENTACIÓN: monodosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: subcutánea.

SITIO DE APLICACIÓN: Cara externa o posterior del brazo (músculo deltoides).

CONTRAINDICACIONES DE LA VACUNA TRIPLE VIRAL:

- ✓ Reacción alérgica grave (anafilaxia) ante una dosis anterior o a componentes de la vacuna, como por ejemplo gelatina y neomicina.
- ✓ Los niños inmunocomprometidos **NO** deben recibir la vacuna SRP.
 - Inmunodeficiencias primarias.
 - Infección por VIH con recuento de linfocitos CD4 < 15%.
 - Inmunosupresión por fármacos.
 - Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.
 - Enfermedad oncológica activa.

PRECAUCIONES:

- ✓ Púrpura trombocitopénica.
- ✓ Enfermedad aguda moderada o grave.
- ✓ Reciente administración de sangre y/o hemoderivados. Se deben respetar los intervalos sugeridos de 6 y 7 meses respectivamente.

En la vacunación sucesiva con vacunas parenterales de virus atenuados (triple viral, varicela y fiebre amarilla) **debe observarse un intervalo mínimo de 28 días entre las dosis.**



VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA INYECTABLE (IPV)

Es una suspensión acuosa de virus poliomiélicos tipo 1, 2 y 3 inactivadas en formaldehído. **No requiere reconstitución.**

DOSIS: 0,5 ml.

CONSERVACIÓN: entre +2°C y +8°C. No se debe congelar ni exponer al calor.

PRESENTACIÓN: frascos multidosis por 5 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular.

SITIO DE APLICACIÓN: Cara externa o posterior del brazo (músculo deltoides).

RECORDAR:

- ✓ El color de la vacuna puede variar entre naranja-amarillo y naranja rojizo.
- ✓ Una vez abierto el vial deberá utilizarse dentro de los 28 días siguientes.

CONTRAINDICACIONES:

- ✓ Reacción alérgica grave (anafilaxia) ante una dosis anterior o a componentes de la vacuna como estreptomycin, neomicina o polimixina B.

PRECAUCIONES:

- ✓ Enfermedad aguda grave.

CONSIDERACIONES EN HUÉSPEDES INMUNOCOMPROMETIDOS:

- ✓ Las inmunodeficiencias no son una contraindicación para recibir IPV.
- ✓ Las niñas y niños nacidos prematuros deben recibir la dosis adicional de IPV.
- ✓ En los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor, se deberá respetar el intervalo entre la finalización de éste y la aplicación de la vacuna, a fin de asegurar una respuesta inmune adecuada:
 - 6 a 12 meses post trasplante
 - 3 meses después de quimioterapia
 - 1 mes después de corticoterapia sistémica
 - 1 mes post radioterapia total

Pueden administrarse simultáneamente con otras vacunas. De administrarse más de una vacuna, **deben aplicarse en sitios anatómicos diferentes.**